

Patienteninformation: Analgosedierung

Liebe Patientin,
lieber Patient,

Sie wünschen Ihre Behandlung mit einer Sedierung. Umgangssprachlich wird hier oft von «Dämmer Schlaf» gesprochen. Das Prinzip beruht darauf, dass Ihnen in eine Vene (zumeist am Arm) ein Beruhigungsmittel gespritzt wird. In unserer Praxis verwenden wir in der Regel das Medikament «Midazolam». Dabei handelt es sich um ein kurzwirksames und gut steuerbares Beruhigungsmittel aus der Gruppe der Benzodiazepine.

Die Wirkungen des Medikaments beinhalten Müdigkeit, Unterdrückung von Angstzuständen, Lockerung der Muskulatur, verlangsamte Wahrnehmung, ggf. Schwindel und eine verminderte Erinnerungsfähigkeit an die Vorgänge während des operativen Eingriffs. Die Wirkdauer des Medikaments beträgt in der Regel 45 Minuten; hier existieren zum Teil allerdings erhebliche zwischenmenschliche Unterschiede.

Es ist durchaus normal, dass Sie — während das Medikament bereits seine Wirkung entfaltet — ebendiese Wirkung als nur begrenzt oder nicht vorhanden empfinden. Sie werden sich allerdings nicht mehr an alle Details des Eingriffs erinnern können. Die Zeitempfindung ist ebenfalls gestört.

Das Medikament Midazolam ist sehr nebenwirkungsarm und gut erforscht. Es ist tagtäglich im breiten klinischen Einsatz. Zu den Wirkungen und auch Nebenwirkungen zählt die Verminderung von Aufmerksamkeit und Schutzreflexen bis hin zur Verminderung des Atemantriebs.

Um Sie bestmöglich zu versorgen, werden Ihre Kreislaufparameter während der Operation ständig überwacht. Durch behutsame Applikation des Medikaments lässt sich die Wirkung in der Regel sehr gut steuern und die Nebenwirkungen treten nicht auf.

Sehr selten kann der unterdrückende Effekt auf den Atemantrieb so stark werden, dass Ihnen ein Gegenmittel, welches die Wirkung von Midazolam sofort aufhebt, appliziert werden muss. In Grenzfällen kann die Gabe von Sauerstoff oder sogar die Intubation und Beatmung notwendig werden.

Eine extrem ungewöhnliche, jedoch mögliche Nebenwirkung von Midazolam ist die Verstärkung von Emotionen, so dass Sie nicht beruhigt sondern eher agitiert wirken. Zumeist lässt diese Nebenwirkung schnell nach und kann durch Anpassung der Dosis von Midazolam abgefedert werden.

Bitte bedenken Sie, dass das Medikament auch nach dem Eingriff noch nachwirken wird und Sie für 24 Stunden als nur begrenzt geschäftsfähig gelten. Das bedeutet, Sie dürfen kein Fahrzeug führen und keine Verträge abschließen. Zusätzlich ist es wichtig, dass Sie nach dem Eingriff persönlich abgeholt und von einer Begleitperson auch zu Hause weiter überwacht werden.

Bitte sprechen Sie uns bei weiteren Fragen an.
Ihre Praxis Dr. Dr. Tröltzsch



Zahnärztliche
Gemeinschaftspraxis
**Fachärzte für
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie**
Dr. med. Dr. med. dent.
Volker Tröltzsch
Dr. med. Dr. med. dent.
Markus Tröltzsch
PD Dr. med. Dr. med. dent.
Matthias Tröltzsch
Maximilianstraße 5
91522 Ansbach
Tel. (0981) 14 000
Fax (0981) 77 102
info@dr-troeltzsch.de
www.dr-troeltzsch.de